

CÔNG TY CỔ PHẦN CURAVET VIỆT NAM

Địa chỉ: Ngọc Lịch, Xã Như Quỳnh Tỉnh Hưng Yên Việt Nam

Điện: 0359436029 - Email: curavet6886@gmail.com

TT	TÊN SẢN PHẨM	THÀNH PHẦN	CÔNG DỤNG	LIỀU LƯỢNG	QUY CÁCH	GIÁ BÁN
I. THUỐC TIÊM						
I.1 DUNG DỊCH TIÊM						
1	TULAVET	Tulathromycin 10.000mg Dung môi vừa đủ 100ml		Heo con: 1ml/5kg thể trọng/ngày Heo lớn: 1ml/10kg thể trọng/ngày	10ml/chai 120chai/thùng	
					20ml/chai	
					100ml/chai; 24 chai/thùng	
2	AZIFLO	Azithromycin.... 10 g Florfenicol 10g Dung môi vừa đủ .. 100 ml		Tiêm sâu vào bắp thịt. Heo con: 1ml/5kg thể trọng/ ngày. Heo lớn: 1ml/10kg thể trọng/ ngày. Gia cầm: 1ml/4kg thể trọng/ ngày. Trâu, bò: 1ml/20kg thể trọng/ ngày. Điều trị: Dùng liên tục 3 – 5 ngày	20ml/chai 120 chai/thùng	
					100ml/chai 24 chai/thùng	
3	MAX TYLAN	Tylosin tartrate ... 20.000 mg Bổ sung: Colistin sulfate 76.000.000 UI Dung môi vừa đủ ... 100ml	Đặc trị hô hấp phức hợp do mycoplasma, tiêu chảy nặng.			
4	OXYTETRA LA	Oxytetracycline 20g Lidocain hydrochloride ... 0.5g Dung môi vừa đủ.....100ml		Tiêm sâu vào bắp thịt, pha với dịch truyền Glucose để truyền tĩnh mạch hoặc trích xoang bụng. Phòng bệnh: Heo con: 1ml/10kg thể trọng. Heo lớn: 1ml/ 15kg thể	20ml/chai 120chai/thùng	

				trọng. Liều trị: Sốt sữa, bại liệt sau khi sinh: 1ml/ 10kg thể trọng, ngày 1 lần, liên tục trong 3 ngày.	100ml/chai 24chai/thùng	
5	FLODOX INJ	Florfenicol: 10g Doxycycline: 10g Dung môi vừa đủ ... 100ml	Đặc trị bệnh sốt bỏ ăn không rõ nguyên nhân. viêm phổi địa phương trên heo (SEP), bệnh viêm phổi dính sườn (App), hồng lỵ, viêm ruột, tiêu chảy, viêm khớp, viêm da, bệnh sảy thay truyền nhiễm. Viêm vú, tụ huyết trùng, sưng phù đầu, các trường hợp sốt bỏ ăn ko rõ nguyên nhân	Chỉ tiêm bắp. Heo con: 1ml/10kg thể trọng. Heo lớn: 1ml/15kg thể trọng. Bê, cừu, dê: 1ml/20kg thể trọng. Trâu bò: 1ml/ 30kg thể trọng. Điều trị 3 -5 ngày.	20ml/chai 120chai/thùng	
6	LINCO-SPEC	Spectinomycin . 10g Lincomycin..... 5g Dung môi vừa đủ ... 100ml	Đặc trị bệnh ho, viêm phổi do mycoplasma spp, viêm phổi – viêm màng phổi, phó thương hàn, tiêu chảy mọi lứa tuổi	Tiêm sâu vào bắp thịt. Heo con: 1ml/10kg thể trọng. Heo lớn, bê, cừu, dê: 1ml/15kg thể trọng. Trâu, bò: 1ml/25kg thể trọng.	20ml/chai 120chai/thùng	
7	MAX FLO 45	Florfenicol..... 45g Dung môi vừa đủ ... 100ml	Điều trị ho, viêm phổi, viêm ruột, tiêu chảy, thương hàn, CRD ghép E.coli	Heo con: 1ml/5 - 7kg thể trọng. Heo lớn trên 50kg, Bê, cừu, dê: 1ml/10- 15kg thể trọng Trâu, bò: 1ml/20 - 25kg thể trọng. Gia cầm: 1ml/4kg thể trọng.	20ml/chai 120chai/thùng	
8	COLI-COX	Sulfamonomethoxine ... 20g Trimethoprim 2g Dung môi vừa đủ 100ml	Đặc trị tiêu chảy cầu trùng	1ml/ 1 heo con/ ngày lúc 3 - 5 ngày tuổi. Sử dụng 1 liều đơn nhất. Có thể tiêm nhắc lại mũi thứ 2 trước khi cai sữa 3 - 5 ngày	20ml/chai 120chai/thùng	
9	TICOMAX	Tiamulin hydrogen fumarate ... 10.000 mg Colistin sulfate 18.000.000 UI Dung môi vừa đủ 100ml			100ml/chai 24chai/thùng	

10	MELO+PARA	Meloxicam 5mg Paracetamol 150mg Dung môi vừa đủ 1ml		Tiêm bắp hoặc dưới da. Heo con: 1ml/ 10 kg thể trọng/ ngày Heo trên 50kg: 1ml/ 15 kg thể trọng/ngày.	20ml/chai 120chai/thùng	
					100ml/chai 24chai/thùng	
11	GLUCO K + C	Calcium gluconate ... 20.000 mg Boricacid ... 3.000 mg Magnesium chloride (hexahydrate) ... 100 mg Dung môi vừa đủ 100ml	Giảm đau, kháng viêm hạ sốt trong các bệnh nhiễm trùng, các triệu chứng(sốt, đau) khi viêm vú, viêm tử cung, mất sữa trên heo nái. Hỗ trợ điều trị triệu chứng nhiễm trùng hô hấp, viêm vú, viêm khớp trên heo và gia súc.	Tiêm sâu vào bắp thịt. Heo: 1ml/15kg thể trọng/ngày. Trâu, bò, ngựa: 1ml/25kg thể trọng/ngày	20ml/chai 120chai/thùng	
					100ml/chai 24	
					chai/thùng	
12	BIOTOSAL PRO	Butaphosphan 10g Vitamin B12 10mg Dung môi vừa đủ ... 100ml	Kích thích biến dưỡng, điều chỉnh rối loạn trao đổi chất, giúp thú mau hồi phục sau mắc bệnh, mau lớn. Phục hồi các rối loạn sinh sản như khô thai, sảy thai, chậm lên giống. Chống stress, ổn định thần kinh, ngừa bệnh, chống cắn- đánh nhau ở heo, giúp heo con hồng hào, lông da bóng mượt, tăng năng suất chăn nuôi	Tiêm bắp thịt hoặc dưới da Heo con: 1ml/ 10kg thể trọng/ ngày Heo trên 50kg: 1ml/ 15kg thể trọng/ ngày Heo nái: 1ml/ 15kg thể trọng trước đẻ 3 -5ngày Heo nọc: 1ml/ 15kg thể trọng/ ngày. Bê, dê cừu: 1ml/15- 20kg thể trọng/ngày. Trâu, bò: 1ml/20- 30kg thể trọng/ngày. Gia cầm: 1ml/4kg trọng/ngày	20ml/chai 120chai/thùng	
					100ml/chai 24 chai/thùng	
13	B COMPLEX	Vitamin B1 0,5g Vitamin B2 0,5g Vitamin B6 1,1g Nicotami..... 3g Pantothenol 2g Vitamin B12 2,5g Tá dược vừa đủ ... 100ml	Kích thích tiêu hóa, tăng trọng nhanh. Nâng cao năng suất vật nuôi. Phòng bệnh, chống stress. Dùng kết hợp với kháng sinh khi điều trị giúp thú mau phục hồi. phục hồi các rối loạn trao đổi chất.	Tiêm sâu vào bắp thịt. Heo con: 1ml/5 – 10kg thể trọng. Heo trên 50kg: 1ml/15kg thể trọng. Gia cầm: 1ml/ 4 – 5kg thể trọng.	20ml/chai 120chai/thùng	
					100ml/chai 24chai/thùng	

14	BROMMAX	Bromhexine ...20mg Dung môi vừa đủ ..1ml	Làm loãng và tan đờm, dùng hỗ trợ điều trị trong các bệnh đường hấp trên trâu bò, heo và gia cầm	Tiêm sâu vào bắp thịt. Heo con: 1ml/5 –7kg thể trọng/ngày. Heo trên 50kg: 1ml/10kg thể trọng/ ngày. Heo nái: 1ml/15kg thể trọng trước khi đẻ 3–5 ngày Heo nọc: 1ml/15kg thể trọng/ngày. Bê, cừu, dê: 1ml/20kg thể trọng/ ngày. Trâu bò: 1ml/30kg thể trọng/ngày.	20ml/chai 120chai/thùng	
15	ANAGIN C	Analgin 30.000 mg Vitamin C 10.000 mg Dung môi vừa đủ...100m	Hạ sốt, trợ sức, kháng viêm, giảm đau nhanh. Được chỉ	Tiêm sâu vào bắp thịt. Heo con: 1ml/10 kg thể trọng / ngày. Heo lớn, bê, cừu, dê: 1ml/ 15 kg thể trọng / ngày.	100ml/chai 120chai/thùng	
16	BIO ALPHATRY	Alpha-chymotrypsin ... 400mg Trypsin100mg Tá dược vừa đủ . 100g			20ml/chai 120chai/thùng	
					100ml/chai 24chai/thùng	
					100ml	
17	QUYNOLINE (enro 15%)	Enrofloxacin (Hydroiodide axit 1- Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(4-etyl-1-piperazinyl)-quinoline-3carboxylic) 15g Dung môi vđ ... 100ml				

18	GENTACIN INJ	Gentamicin sulphate ... 10.000 mg Dung môi vừa đủ ... 100ml		Tiêm sâu vào bắp thịt. Heo con trước cai sữa: 0.5-1ml/con/ngày. Heo con sau cai sữa: 1ml/5 – 7kg thể trọng / ngày. Heo lớn trên 50kg: 1ml/10kg thể trọng /ngày. Bê, cừu, dê: 1ml/15kg thể trọng/ ngày. Trâu, bò: 1ml/20kg thể trọng/ ngày. Gia cầm: 1ml/4kg thể trọng.	20ml/chai 120chai/thùng	
19	FE + B12	Iron (Iron dextran) 10g Vitamin B12 10.000µg Dung môi vừa đủ ... 100ml		Tiêm sâu vào bắp thịt: Heo con: 1ml/10kg thể trọng. Heo lớn: 1ml/15 – 20kg thể trọng. Trâu, bò: 1ml/30kg thể trọng. Gia cầm: 1ml/5 – 8kg thể trọng.	20ml/chai 120chai/thùng	156,000
20	IVERMAX	Ivermectin 2g Dung môi vđ ... 100ml		Tiêm sâu vào bắp thịt Heo con theo mẹ : 1ml/5kg thể trọng/ ngày Heo con cai sữa: 1ml/10kg thể trọng/ngày Điều trị 2-3 ngày	20ml/chai 120chai/thùng	
21	FLUXIN	Flunixin meglumin 5.000 mg Dung môi vừa đủ 100ml		Tiêm sâu vào bắp thịt hoặc tiêm tại vị trí bị viêm, sưng. Heo: 1ml/15-20 kg thể trọng. Trâu, bò, ngựa: 1ml/30kg thể trọng. Thời gian ngưng sử dụng thuốc: không cần thời gian ngưng thuốc.	20ml/chai 120chai/thùng	
I.2 HỖN DỊCH TIÊM						
1	CEFTI 10 LA	Ceftiofur HCl 10g Dung môi vừa đủ ... 100ml	Chuyên trị ho, viêm màng phổi, viêm phổi cấp tính, tụ huyết trùng, viêm màng não, viêm tử cung, viêm thận, viêm da, viêm khớp và điều trị bệnh kế phát của những bệnh do virus như heo: heo tai xanh (PRRS), FMD, dịch tả...	Heo con: 1ml/ 10kg thể trọng. Heo trên 50 kg và các gia súc khác: 1ml/ 15- 20kg thể trọng. Bê, cừu, dê: 1ml/20kg thể trọng Trâu, bò: 1ml/30kg thể trọng 1 mũi tiêm duy nhất cho 72 giờ. Bệnh nặng nhắc lại sau 48h.	20ml/chai 120chai/thùng	
					100ml/chai 24chai/thùng	

2	BIO- CEFOTAXIM	Cefotaxime sodium: 10g Dung môi vừa đủ	Chuyên trị ho, viêm màng phổi, viêm phổi cấp tính, tụ huyết trùng, viêm màng não, viêm tử cung, viêm thận, viêm da, viêm khớp sung phù đầu. và điều trị bệnh kế phát của những bệnh do virut như heo: heo tai xanh (PRRS), FMD, dịch tả...	Heo con: 1ml/ 10kg thể trọng. Heo trên 50 kg và các gia súc khác: 1ml/ 15-20kg thể trọng. Bê, cừu, dê: 1ml/20kg thể trọng Trâu, bò: 1ml/30kg thể trọng 1 mũi tiêm duy nhất cho 72 giờ. Bệnh nặng nhắc lại sau 48h	20ml/chai 120chai/thùng	
					100ml/chai 24chai/thùng	
3	AMOX 20% LA	Amoxicillin trihydrate ... 200mg Dung môi ketofen vừa đủ 1ml	Trên heo: viêm vú, viêm tử cung, mắt sữa, MMA. Tiêu chảy do E.coli, bệnh phù trên heo con cai sữa. Trâu bò, dê cừu: đặc trị viêm phổi, pho thương hàn, tụ huyết trùng. Gia cầm: bệnh CRD, viêm xoang mũi, tiêu chảy phân trắng, phân xanh, thương hàn, tụ huyết trùng.	Heo con: 1ml/ 10kg thể trọng. Heo trên 50kg, dê, cừu, bê: 1ml/ 20kg thể trọng. Trâu, bò: 1ml/30kg thể trọng. Gia cầm: 1ml/5kg thể trọng. Đặc biệt tiêm cho heo nái 12h sau sinh.	20ml/chai 120chai/thùng	
					100ml/chai 24c	
4	GENTAMOX LA	Trong 100ml: Amoxycillin Trihydrate: 15g Gentamycine Sulphate: 4g	Điều trị ho, viêm phổi, sung phù đầu do E.coli, viêm ruột, tiêu chảy, tụ huyết trùng, viêm khớp. Tiêm 1 mũi cho heo con trước khi cai sữa phòng bệnh sung phù đầu do E.coli.	Heo lớn: Hội chứng MMA: 1ml/10-15 kg thể trọng, dùng liên tục trong 2 ngày. Nhiễm trùng hô hấp: 1ml/10-15kg thể trọng, dùng liên tục trong 3-5 ngày. Heo con: 1ml/8-10kg thể trọng, dùng liên tục 3-5 ngày. Trâu, bò: 1ml/25kg thể trọng. Nhiễm trùng đường hô hấp, viêm móng, viêm da: dùng liên tục 3-5 ngày. Viêm vú, viêm tử cung dùng liên tục 2 ngày. Bê, nghé: 1ml/10-15kg thể trọng, dùng liên tục 3-5 ngày.	20ml/chai (120chai/thùng)	
					100ml/chai (24chai/ thùng)	
5	OXOMIC	oxolimic.. 20g Dung môi vđ ...100ml			20ml/chai 120chai/thùng	
					100ml/chai 24chai/thùng	

6	INTAPHEN	Procaine penicillin G... 10.000.000 IU Benzathine penicillin G 10.000.000 IU Dihydrostreptomycin sulfat ... 4 g Dung môi vừa đủ ... 100ml			20ml/chai 120chai/thùng	
					100ml/chai	

I.3 BỘT PHA TIÊM

1	BỘ VỊT 2	Cefotaxim.....10.000mg Gentamicin sulfate. 10.000mg Tas được Subactan Vừa đủ 100ml	Trên heo và gia súc: điều trị ho, viêm màng phổi, viêm phổi cấp tính, tụ huyết trùng. Viêm màng não tủy, viêm tử cung, viêm thận, viêm da, viêm khớp. Điều trị bệnh kế phát của những bệnh do virus như tai xanh, dịch tả... Trên gà, vịt: đặc trị bệnh CRD và các biến chứng của bệnh CCRD, tụ huyết trùng, sổ mũi truyền nhiễm, sưng phù đầu.	Heo con: 1ml/ 10kg thể trọng. Heo trên 50 kg và các gia súc khác: 1ml/ 20kg thể trọng. Gà, vịt: 1ml/ 8kg thể trọng. Lưu ý: ko dùng quá liều chỉ định.	100ml/chai 60chai/thùng	
					250ml/chai 12chai/thùng	

II. KHÁNG SINH BỘT

1	MAX-MOX 500	Trong 1kg có: Amoxicillin: 500.000mg Colistin: 2 tỷ UI	ĐẶC TRỊ CÁC BỆNH HÔ HẤP VÀ TIÊU HÓA TRÊN GIA CẦM trên gà, vịt, cút: phòng và trị bệnh hô hấp mãn tính CRD và các biến chứng của bệnh (CCRD) Viêm xoang mũi, tiêu chảy, phân trắng, phân xanh.	Trên gà, vịt, cút: Liều tổng quát: 1g/20- 25kg thể trọng Phòng bệnh: 1g/4 lít nước uống, dùng liên tục 3 ngày Trị bệnh: gấp đôi liều phòng, dùng liên tục 5-7 ngày	10g/gói 600gói/thùng	
					Kg/lon 10 trong 1 6 lon/thùng	

2	COLIMOXINE 20	Amoxicillin trihydrate ... 200.000 mg Colistin sulfate 760.000.000 IU Tá dược vừa đủ 1000g		Pha vào nước uống hoặc trộn đều vào thức ăn. Trên gia cầm: liều tổng quát: 1g/15-20kg thể trọng. Trị bệnh: 1g/ 1 lít nước uống, dùng liên tục 5-7 ngày. Trên gia súc: Liều tổng quát: 1g/15- 20kg thể trọng. Trị bệnh: 1g/ 20kg thể trọng hoặc 1 kg/1 tấn thức ăn, dùng liên tục 5-7 ngày. Thời gian ngưng sử dụng thuốc: 7 ngày trước khi giết thịt.	1kg/ gói (10 trong 1)	
3	TIAMULIN	Tiamulin hydrogen fumarate ... 10g Tá dược vừa đủ 100g				
4	BIO- AMSUL	Ampicilin17.500mg Sulfadimethoxin...25.000mg Tá dược vừa đủ. 1000g		z		
5	AMPI-COLI 50%	Ampicillin trihydrate 50g Colistin sulfate ... 1.900.000.000UI Tá dược vừa đủ... 100g	Gà, vịt, cút: trị viêm ruột, tiêu chảy do E.coli, thương hàn do Salmonella, tụ huyết trùng, viêm rốn và nhiễm trùng máu. Heo và gia súc: tiêu chảy do E.coli, phó thương hàn, tụ huyết trùng	Gà, vịt, cút: 1g/20-25kg thể trọng hoặc 1g/4 lít nước uống, dùng liên tục 5-7 ngày. Heo và gia súc: 1g/30kg thể trọng hoặc 1g/2,5kg thức ăn, dùng liên tục trong 5-7 ngày Thời gian ngưng sử dụng thuốc: 12 ngày trước khi giết mổ	1kg/gói (12 gói/thùng)	
6	AMPICOLI	Ampicillin42.000mg Colistin 125.000.000 UI Tá dược vừa đủ 1kg	Gà, vịt, cút: trị viêm ruột, tiêu chảy do E.coli, thương hàn do Salmonella, tụ huyết trùng, viêm rốn và nhiễm trùng máu. Heo, bê, nghé: tiêu chảy do E.coli, phó thương hàn, tiêu chảy phân xanh, phân trắng, tụ huyết trùng	Gà, vịt, cút: Liều tổng quát: 1g/3.5-7kg thể trọng. Phòng bệnh: 1g/7kg thể trọng hoặc 1.5g/1 lít nước uống, dùng liên tục 5-7 ngày. Heo, bê, n	50g/gói 180 gói/thùng	

7	FLORDOX	Flofenicol: 200g Doxycylin Hyclate: 100g; Tá dược vừa đủ: 1kg	Đặc trị viêm phổi, thương hàn. Heo và gia súc: Phòng và trị các bệnh: Viêm phổi địa phương (SEP), nhiễm trùng đường hô hấp như ho, viêm phổi. Các bệnh đường ruột: Viêm ruột tiêu chảy do E.Coli, phó thương hàn. Gà, vịt, cút: Phòng trị bệnh thương hàn, bệnh hô hấp mãn tính (CRD), CRD ghép với E.coli (CCRD) với các triệu chứng như ho, chảy nước mũi, viêm khớp, sưng phù đầu,...	Trộn đều vào thức ăn hoặc pha vào nước uống. Heo, bê, nghe, dê, cừu: Phòng bệnh: 1g/4 lít nước uống hoặc 1g/2kg thức ăn hoặc 1g/40kg thể trọng, dùng liên tục 3-5 ngày. Định lý 2-3 tuần dùng 1 đợt. Gà, vịt, cút: Phòng bệnh: 1g/ 3 lít nước uống hoặc 1g/1,5kg thức ăn hoặc 1g/20kg thể trọng, dùng liên tục 3-5 ngày. Định kỳ 2-3 tuần 1 đợt. Trị bệnh: Gấp đôi liều phòng, dùng liên tục 5-7 ngày. Thời gian ngưng sử dụng thuốc: 7 ngày trước khi giết mổ.	Kg/gói (10 trong 1)	
8	LINSPEC	Lincomycine HCL: 220 g Spectinomycine HCL: 220g Tá dược vừa đủ: 1kg	Heo và gia súc: phòng và trị các bệnh viêm phổi địa phương (SEP), nhiễm trùng đường hô hấp: ho, viêm phổi. Trên gia cầm: phòng và trị bệnh viêm khớp .hô hấp mãn tính CRD, và các biến chứng của bệnh (CCRD): khó thở, khô khè trên gà, vịt, sưng phù đầu. Phòng và trị bệnh viêm khớp do Mycoplasma, sưng khớp, gia cầm đi đứng khó khăn, bại liệt. Tăng hiệu quả vaccin trong thời điểm chủng ngừa.	Liều tổng quát: 1g/15kg thể trọng. Trên heo: trộn vào thức ăn. Liều phòng: ½ liều điều trị. Dùng liên tục 3 ngày. 21 ngày dùng 1 đợt.. Liều trị 1kg/250kg thức ăn dùng liên tục 5 – 7 ngày Trên gia cầm: Liều phòng: 1g/7- 10kg thể trọng. Liều trị: 1g/2 lít nước. Cho uống liên tục 3 ngày.	Kg/gói 10 trong 1 12 gói/thùng	
9	TILVALOSIN PRO	Tilvalosine tartrat 200.000 mg Tá dược vừa đủ 1000g	Heo và gia cầm: phòng và trị các bệnh viêm khớp viêm phổi địa phương Trên gà: bệnh hô hấp mãn tính (CRD) viêm khớp do Mycoplasma gallisepticum gây ra trên gà với các triệu chứng như : ho, sổ mũi, chảy nước mắt,viêm khớp, sưng phù đầu.	Trên heo: trộn vào thức ăn. Liều tổng quát: 1g/20- 25kg thể trọng.. Liều phòng: 1kg/2 tấn thức ăn. Dùng liên tục 3- 4 ngày.. Liều trị 1kg/1 tấn thức ăn 9han liên tục 5 – 7 ngày Trên gia cầm: Liều tổng quát: 1g/15kg thể trọng. Liều phòng. Dùng liên tục 3- 4 ngày	Kg/lon 10 trong 1 6 lon/thùng	

10	OTC-ADE55	Oxytetracycline HCL: 550g Tá dược vừa đủ: 1000g	10han10v à trị bệnh viêm phổi, viêm màng phổi, nhiễm trùng máu, bệnh tụ huyết trùng, viêm ruột, tiêu chảy phân trắng, thương hàn, tụ huyết trùng, hội chứng MMA, viêm đường tiết niệu... trên heo, trâu, bò, gia cầm	Hòa vào nước uống hoặc trộn đều vào thức ăn. Trên heo: liều tổng quát: 1g/40kg thể trọng. Trị bệnh: heo con: 1kg/2 tấn thức ăn. Heo lớn: 1kg/34 tấn thức ăn. Phòng bệnh: ½ liều điều trị. Gia cầm: 1g/20-25kg thể trọng.	Kg/gói 10 trong 1 12 gói/thùng	
11	AMOXCOLIS 64	Amoxicillin trihydrate: 640g Colistin...2.850.000.000 Tá dược có Acid clavulanic vđ.....1000g	Đặc trị ho, viêm phổi, hen suyễn, coryza, sung phù đầu, viêm ruột tiêu chảy, tụ huyết trùng, viêm đường tiết niệu, nhiễm trùng da, nhiễm trùng vết thương trên heo, bê, nghé, gia cầm.	Pha vào nước uống hoặc trộn vào thức ăn. Trị bệnh: 10han liên tục 5-7 ngày. Heo, bê, nghé: 1g/40kg thể trọng hoặc 1kg/2-3 tấn thức ăn. Gia cầm: 1g/20-25 kg thể trọng hoặc 1g/2.5 lít nước uống Phòng bệnh: bằng ½ liều điều trị, 10han liên tục 3-4 ngày	Kg/lon 10 trong 1 6 lon/thùng	
12	BROMHEXINE (Hàm lượng cao)	Bromhexine HCL ... 30.000 mg Paracetamol...2.500 mg 3-(2-Methoxyphenoxy) propane-1, 2-diol (Guaifenesin) ... 500mg Vitamin C ...50.000mg Axit citric 500mg Tá dược vừa đủ 1000g	Giảm ho, long đờm, giãn phế quản, thông khí quản giúp thú dễ thở. Giảm đau, hạ sốt. Dùng kết hợp kháng sinh để tăng hiệu quả điều trị trong các bệnh viêm phế quản, viêm thanh phế quản, viêm phổi, suyễn, CRD.	Gia cầm: 1g/ 8kg thể trọng. Heo và gia súc: 1g/ 10 - 15kg thể trọng. Dùng kết hợp với kháng sinh liên tục trong 5 - 7 ngày	Kg/gói 10 trong 1 12 gói/thùng	
13	DOXY Guard 50	Doxycycline HCL: 500g Tá dược vừa đủ 1kg	Kháng sinh phổ rộng đặc trị các bệnh nhiễm trùng dạ dày – ruột, nhiễm trùng đường hô hấp gây ra bởi các vi khuẩn nhạy cảm với doxycycline như: paturella, Staphylococci, Blucella, chlamydia, mycoplasma	Pha vào nước uống hoặc trộn vào thức ăn. Liều tổng quát: 1g/25- 30 kg thể trọng Liều phòng: 1g/4 lít nước dùng liên tục 3- 4 ngày Điều trị: 1g/2 lít nước uống, dùng liên tục 5- 7 ngày	Kg/lon 10 trong 1 6 lon/thùng	
14	ENRO 50%	Enrofloxacin...500g Tá dược vừa đủ...1000g				

15	ALPHATRY PRO	Alpha-chymotrypsin ... 400mg Trypsin 100mg Tá dược vừa đủ.... 100g	Kháng viêm, giảm xuất huyết, chống phù nề sau phẫu thuật, tan máu bầm do chấn thương, áp xe. Dùng kết hợp với các thuốc kháng sinh làm tăng hiệu quả trong điều trị bệnh đường hô hấp, Ecoli kéo màng, giúp làm lỏng phá màng tan kén thải các dịch tiết đường hô hấp trên trong các bệnh: viêm phổi, viêm phế quản, viêm xoang mũi,... Sản phẩm chỉ hỗ trợ điều trị, không thay thế kháng sinh		Kg/lon 10 trong 1 6 lon/thùng	
16	APRAMY	Apramycin sulfate ... 20g Tá dược vđ... 100g	Chỉ định: sản phẩm đặc biệt dùng cho gia súc – gia cầm trong các trường hợp: hạ sốt nhanh, giảm đau, kháng viêm, hỗ trợ điều trị các bệnh sốt cao gây giảm ăn, ủ rũ như: gumboro, tai xanh, sốt bỏ ăn không rõ nguyên nhân... Chống stress nhanh chóng và hiệu quả. Giúp thú phòng bệnh và phục hồi sức.	Pha và nước uống hoặc trộn đều vào thức ăn. Gia cầm: 1g/2-4l nước uống hoặc 1g/20-25kg thể trọng Heo: 1g/40-50kg thể trọng. Trâu bò: 1g/ 60-80 kg thể trọng.	Kg/gói 10 trong 1 12 gói/thùng	
17	BIO- PARA C	Vitamin C.... 100.000mg Paracetamol...300.000mg Tá dược vừa đủ. ... 1000g				
II. SẢN PHẨM ĐẶC TRỊ GIUN SÁN, SÁT TRÙNG VẾT THƯƠNG,						
1	FUGACAR	Fenbendazol 5g Tá dược vừa đủ ... 100g	Phòng và trị các trường hợp nhiễm giun tròn và dẹp kí sinh ở ruột, đường hô hấp và tiết niệu của heo và gia cầm. Đặc biệt được chỉ định trong những trường hợp nhiễm các loại giun sau: ascaris suum, oesophagostomum sp, strongyloides sp, hyostrongylus sp...	Sử dụng 1 lần duy nhất. Trên heo: 1g/10kg thể trọng. Trên gà, vịt, cút: 1g/5kg thể trọng.	10g/gói 360 gói/thùng 50g/gói 180 gói/thùng 100g/gói 120 gói/thùng	
2	FUOXY	Sulfaguanidin 50g Trimethoprim 10g Tá dược vừa đủ ... 1000g				

3	MONOCO	Sulfamonomethoxine ... 400.000 mg Trimethoprim 80.000 mg Tá dược vđ.....1000g	Đặc trị ký sinh trùng đường máu, đầu đen (kén ruột, hoa gan), viêm ruột hoại tử, phân sấp vàng có bọt, mào tái, mào rụt, sung mắt, sung phù đầu do Cozyra. Các bệnh cầu trùng		10g	
					1kg	
4	BIO AMPROLIUM	Amorolium HCL.....100g Bổ sung sulfamonomethoxin sodium Tá dược vừa đủ 1000g				
5	OXYTRA SPAY	Oxytetracycline HCl ... 500mg			100ml	
6	INVEDELTA - BIOCIL	Deltamethrin 20mg Dung môi vừa đủ ... 10ml			10ml	

IV. DUNG DỊCH UỐNG

1	SPECOL	Colistin sulfate20MUI Spectinomycin 5g Dung môi vừa đủ ...100ml	Đặc trị phân trắng, phân vàng, tiêu chảy phân có máu do E.coli, Clostridium và bệnh phù đầu trên heo. Sản phẩm dạng siro có vị ngọt nên rất dễ uống	Bơm trực tiếp vào miệng. Heo con trước cai sữa: 1ml/con/ngày. Định kỳ 5 - 7 ngày 1 lần. Heo con sau cai sữa: 2ml/con/lần/ngày. Định kỳ 5 - 7 ngày 1 lần.		
2	TOLRIL PLUS	Toltrazuril 5.000 mg Bổ sung Sulfamonomethoxine sodium (Nguyên liệu nhật bản) Dung môi vừa đủ ... 10ml				
3	HT- TYMYCO 25	Tilmicosin: 250g Dung môi đặc biệt vừa đủ: 1 lít	Đặc trị các bệnh về đường hô hấp ở gia cầm: bệnh hô hấp mãn tính (CRD) và các biến chứng của bệnh CCRD: khó thở, khó khè(gà) khẹt vịt, sung phù đầu... phòng và trị bệnh viêm khớp.	Gà, vịt con, gà vịt đẻ, gà giống: 1ml/2-3 lít nước uống, dùng liên tục 3-4 ngày. Gà thịt, vịt thịt: 1ml/2 lít nước uống, dùng liên tục 3-4 ngày.	100ml/chai	
					1lít/chai	
4	HT FLOTECH	Florfenicol 30g Dung môi vừa đủ 100ml	Công thức cải tiến mới đặc trị tất cả các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Trên gia cầm: bệnh CRD Ecoli kéo màng, hô hấp phức hợp, thương hàn, tụ huyết trùng, sổ mũi truyền nhiễm, sung phù đầu	Trên gia cầm: Liều phòng: 1ml/4- 6lít nước uống hoặc 1ml/30-40kg thể trọng. Dùng liên tục 2-3 ngày/đợt Liều trị: 1ml/2-3 lít nước uống hoặc 1ml/20- 25 kg thể trọng. dùng liên tục 5-7 ngày.		

5	DOXYLOX PLUS	Florfenicol250.000 mg Doxycycline Hyclate 200.000 mg Dung môi vừa đủ ... 1000ml	ĐẶC TRỊ NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG HÔ HẤP – TIÊU HÓA Phòng trị bệnh CRD, sung phù đầu (do CORYZA) thương hàn, tụ huyết trùng, tiêu chảy do E.coli, viêm xoang mũi, các bệnh ghép giữa CRD và E.coli			
6	DOXYLOX	Florfenicol 1.000 mg Doxycycline Hyclate..... 500 mg Dung môi vừa đủ ... 10ml			10ml	
7	ENRO FLOX	Enrofloxacin.. 200.000 mg Dung môi vừa đủ ... 1000ml	ĐẶC TRỊ NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG HÔ HẤP – TIÊU HÓA THƯƠNG HÀN. Phòng trị bệnh CRD, sung phù đầu (do CORYZA) thương hàn, tụ huyết trùng, tiêu chảy do E.coli, viêm xoang mũi, các bệnh ghép giữa CRD và E.coli	Trên gia cầm: Phòng bệnh: 1ml /20- 25kg thể trọng hoặc 1ml/ 2 lít nước uống, liên tục 2 - 3 ngày/đợt. Đặc biệt, VIP - MONO COX không ảnh hưởng đến năng suất trứng, rất an toàn.		
8	OXONIC 200	Oxolinic acid.....200.000mg Dung môi vừa đủ 1 lít				
9	DICLACOX	Diclazuril: 25.000mg Dung môi vừa đủ: 1 lít	Phòng và trị các loại cầu trùng ở gia cầm. Đặc biệt hiệu quả cao với bệnh cầu trùng đi phân máu tươi, cầu trùng ruột non và cầu trùng manh tràng trên gia cầm			
10	FLUCOXY	Fluconazole 3 g Dung môi vừa đủ.. 100 ml	Phòng và trị các loại cầu trùng ở gia cầm. Đặc biệt hiệu quả cao với bệnh cầu trùng đi phân máu tươi, cầu trùng ruột non và cầu trùng manh tràng trên gia cầm	Trên gia cầm: 1ml/5- 10kg thể trọng Xỏ lã trên gia cầm thịt: xỏ 1 liều duy nhất Gà siêu thịt: xỏ vào lúc 3 tuần tuổi Gà thịt long màu: xỏ vào lúc 4 tuần tuổi Gà đẻ		
11	SELEN - E	Selen (min-max) ... 337,5- 562,5 mg Vitamin E (min) 65.000 IU Dung môi vừa đủ 1.000 ml	Kích hoạt hệ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng, giúp ngăn ngừa hữu hiệu các bệnh do virus, vi khuẩn gây	Heo con trước cai sữa: 1ml / con / 1 lần / ngày, dùng liên tục 2 ngày.		

		Không có kháng sinh, hoocmon và chất cấm	ra. Hội chứng tiêu chảy trên heo TGE, tiêu chảy do E.coli, dịch heo tai xanh... Chống	Heo con sau cai sữa: 2ml / con / 1 lần / ngày, dùng liên tục 2 ngày. Gia cầm: 1ml/4kg thể.		
12	BOGAMAX PRO	Sorbitol (min) ... 350.000 mg Lysine (min) 3.300 mg Methionin (min) 3.000 mg Dung môi vừa đủ ... 1.000ml Không có kháng sinh, hoocmon và chất cấm	Điều hòa chức năng gan, chức năng tiết mật. tăng cường khả năng bài tiết của thận. Sản phẩm đặc biệt được chỉ định ngay sau khi dùng kháng sinh kéo dài hoặc dùng kết hợp với kháng sinh để hỗ trợ điều trị bệnh. Tăng cường hệ miễn dịch, kích thích thèm ăn, tăng khả năng hấp thụ, kích thích tăng trưởng. Nâng cao hiệu quả chăn nuôi.	Gia cầm và heo: 1ml/2 lít nước uống. Giải độc gan thận: 1ml/ 1 lít nước uống		
13	CALCI PLUS	Calcium 34.000 mg Vitamin D3 500.000 IU Phosphorus 2.500 mg Dung môi vừa đủ ... 1000ml	Cung cấp Ca, P và các nguyên tố vi lượng được hấp thụ trọn vẹn qua ống tiêu hóa. Ngăn ngừa stress rất hiệu quả khi thời tiết nắng nóng. Giảm tỉ lệ hao hụt, loại thải trên gia cầm. Ngăn ngừa tình trạng cấn mỏ, mỏng vỏ, yếu chân, bại liệt trên gia cầm. Tình trạng bại liệt sau khi sinh của heo nái. Kích thích tiêu hóa, tăng trọng nhanh	1ml/2 lít nước uống		

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM

CURAVET[®]
TRAO NIỀM TIN - ĐẠT THỊNH VƯỢNG

V. DINH DƯỠNG						
1	BIO-UNYTE VIT	Vitamin A 500.000 UI Vitamin D3 500.000 UI Vitamin E 1.000 mg Vitamin C 20.000 mg Vitamin B1 300 mg Vitamin B6 1.000 mg Vitamin B12 7,5 mg Nicotinamid 1.000 mg Folic acid 400 mg Biotin 300 mg DL-Methionine 4.000 mg Tá dược vừa đủ ... 1.000g		a tan vào nước uống hoặc trộn vào thức ăn . 1g/1 lít nước hoặc 2g/kg thức ăn	ói 10 trong 1 12gói/thùng	
2	ĐIỆN GIẢI GLUCO K-C	odium (bicarbonate) (min-max) .. 1.800 2.400 mg Vitamin K (min) 1.000 mg Vitamin C (min) 1.500 mg	Hỗ trợ điều trị hiện tượng mất nước, mất cân bằng điện giải trong tất cả các bệnh có triệu chứng tiêu chảy. Hạn chế các trường hợp stress do tiêm phòng, chuyển trường, thay đổi thức ăn, thời tiết lúc giao mùa			
3	B- COMPLEX C	Vitamin B1 (min) ... 500 mg Vitamin B6 (min) ... 500 mg Vitamin C (min) ... 2.000 mg Chất mang vừa đủ ... 1.000g	Chống stress, tăng sức kháng bệnh, phòng chống bệnh do thiếu hụt dinh dưỡng, tăng khả năng sinh sản, giảm tiêu tổn thức ăn		1kg/gói 24gói/thùng	
4	CalCi-Kc Plus	Glucose.....100 g Lysin.....50 g NaCl.....50 g KCL25 g Vitamin K3.....5 g DL – Methionin.....50 g Gluconat canxi.....100 g Vitamin C.....100 g Tá dược vừa đủ1000G				
5	VỎ BÉO GIA CẨM,	Vitamin A (min) ... 700.000 IU Methionine (min) 100.000 mg Cystine (min) 2.000 mg Chất mang vừa đủ ... 1.000 g Không có kháng sinh, hoocmon và chất cấm				

6	ÚM THẢO DƯỢC	Oxytetracylin....50.000mg VitaminB1.....1.000mg Vitamin B6.....500mg VitaminB12.....250.000UI Mộc hương xuyên Tâm khở bảo vi sinh vật hữu ích. Tả được vừa đủ...1000g	Hỗ trợ điều trị hiện tượng mất nước, mất cân bằng điện giải trong tất cả các bệnh có triệu chứng tiêu chảy. Hạn chế các trường hợp stress do tiêm phòng, chuyển trường, thay đổi thức ăn, thời tiết lúc giao mùa hoặc thời tiết nóng bức.	Liều tổng quát: 1g/10kg thể trọng. Dùng kết hợp trong tất cả các liệu trình điều trị bệnh tiêu chảy, sốt cao trên gia súc, gia cầm.	Kg/gói 10 trong 1 12 gói/thùng	
7	SG MAU LÊN GIỐNG	Selen sodium 4,5%...2.000mg Vitamin E.....2.000mg Tả được vừa đủ1.0000g	Kích thích lên giống tng đậu thai	1g/ 2 lít nước uống hoặc 1g/1kg thức ăn, dùng liên tục. Khi có biểu hiện rối loạn tiêu hóa hoặc bị tiêu chảy nên dùng liều gấp đôi, liên tục 5-7 ngày	Kg/gói 10 trong 1 12 gói/thùng	
8	LACVET SIÊU TAN	Lactobacillus spp. (min) ... 10^8 CFU Chất mang vừa đủ 1.000 g Không có kháng sinh, hoocmon và chất cắ				
9	LACTY – ZYM	Lactobacillus spp. (min)10^9 CFU/kg Saccharomyces spp. (min) 10^9 CFU/kg Chất mang vừa đủ 1.000 g			1kg/gói 24gói/thùng	
10	KÍCH SỮA HEO NÁI				1kg/gói 24gói/thùng	
11	TĂNG TỐC HEO	Vitamin A (min) ... 600.000 IU Methionine (min) 30.000 mg Cystine (min) 2.000 mg Chất mang vừa đủ ... 1.000 g Không có kháng sinh, hoocmon	Tăng tạo nạc. Kích thích heo ăn mạnh, tăng trưởng nhanh. Hấp thu triệt để dưỡng chất trong thức ăn. Tăng phẩm chất thịt. Heo khỏe mạnh, tăng đề kháng và đồng đều, giảm thiểu chi phí sử dụng kháng sinh, giảm mùi hôi chuồng trại.	Liều tối ưu: 1g /7- 10 kg thể trọng. 10g/1 heo thịt/ngày(trọng lượng trung bình 70-100kg /1heo).1kg dùng cho 100 heo thịt / ngày, hoặc 1 kg / 300 -400 kg thức ăn.	1kg/gói 24gói/thùng	
12	FORENTIC	Ethanol β aminophosphoric acid: 100g Sodium benzoat: 100g Tả được có chứa Nucleotide vừa đủ 1.000g	Phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh gây tổn thương gan, thận trên bê, cừu, dê, heo, gà, vịt như bệnh sỏi thận, kí sinh trùng, nhiễm khuẩn.. Sử dụng thuốc kháng sinh kháng cầu trùng, sulfonamide trong thời gian dài.	Gà, vịt: 1g/10kg thể trọng hoặc 1g/1-2 lít nước uống. dùng liên tục 3-5 ngày. Heo, dê, cừu: 1g/15kg thể trọng . dùng liên tục 3-5 ngày.	1kg/lon 10 trong 1 6 lon/thùng	

13	ĐỒ TÍCH KÍCH LÔNG KÍCH MÀO	Vitamin A.....1.000mg Methionine30.000mg Lysine.....15.000mg Chất mang vitamin. B1 2.000mg Vitamin D3 3.000mg Vitamin PP (500mg)				
VI SÁT TRÙNG						
1	BENCOXIT - BỘT TUYẾT	Benzalkonium chloride ... 15g Glutaraldehyde 15g Dung môi vừa đủ ... 100ml	Tiêu diệt nhanh hầu hết các loại virus gây bệnh như: dịch cúm gia cầm, LMLM, virus gây dịch tiêu chảy TGE, virus PRRS, virus dịch tả heo, virus gumboro, Newcastle, dịch tả vịt, Corona và Rotavirus, Mycoplasma, vi trùng gram âm, gram dương... Thuốc rất an toàn trên gia súc, gia cầm, do đó được sử dụng để sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, phương tiện vận chuyển, vết thương, khử trùng nước uống.	Sát trùng chuồng trại và vùng xung quanh, xe chở gia súc, dụng cụ chăn nuôi, dụng cụ vắt sữa: 2ml/1 lít nước	1lit/chai/thùng	
2	BENCOXIT -	Benzalkonium chloride ... 15g Glutaraldehyde 15g Dung môi vừa đủ ... 100ml	Tiêu diệt nhanh hầu hết các loại virus gây bệnh như: dịch cúm gia cầm, LMLM, virus gây dịch tiêu chảy TGE, virus PRRS, virus dịch tả heo, virus gumboro, Newcastle, dịch tả vịt, Corona và Rotavirus, Mycoplasma, vi trùng gram âm, gram dương... Thuốc rất an toàn trên gia súc, gia cầm, do đó được sử dụng để sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, phương tiện vận chuyển, vết thương, khử trùng nước uống.		1 lít/ chai	
					5 lít can/thùng	